

Bemfola®
75 UI / 150 UI / 225 UI / 300 UI / 450 UI

institutoeuropeode
 **fertilidad**

Bemfola®

75 UI / 150 UI / 225 UI / 300 UI / 450 UI

Bemfola® 75 UI (con 1 ó 10 estuches)

Bemfola® 150 UI (con 1, 5 ó 10 estuches)

Bemfola® 225 UI (con 1, 5 ó 10 estuches)

Bemfola® 300 UI (con 1, 5 ó 10 estuches)

Bemfola® 450 UI (con 1 estuche)

Paso 1:

- Lavarse las manos.
- Si teníamos el envase en nevera sacarlo unos minutos antes de la inyección.

Preparación de la pluma:

- Retire la lengüeta de la aguja.
- Enrosque la aguja hasta que esté bien sujeta.
- Retire el capuchón de protección externo.
- Retire el capuchón de protección interno de la aguja.

Ajuste de la dosis:

- Sujeta la pluma con la aguja hacia arribas. Golpee suavemente con el dedo la pluma para hacer subir las burbujas, si las hubiera.
- Con la aguja todavía apuntando hacia arriba, presione el botón de ajuste de la dosis hasta que haga tope. La barra de activación desaparece y se derramará una pequeña cantidad de líquido.
- Si no se derrama una pequeña cantidad de líquido, no use la pluma.
- Gire el botón de ajuste de la dosis hasta que aparezca la dosis deseada (indicador de la dosis) en la ventana de visualización.
- La pluma precargada está ahora lista para la inyección.

Inyección de la dosis:

- Inyecte inmediatamente la solución: su médico o enfermero le habrá indicado dónde ponerse la inyección. Para reducir al mínimo la irritación de la piel, seleccione cada día un lugar de inyección diferente.
- Limpie la zona elegida de la piel con una gasa empapada en alcohol.
- Pliegue suavemente la piel e introduzca la aguja con un ángulo de 45° ó 90°, con un movimiento similar al de los dardos.
- Empuje el botón de ajuste de la dosis hasta que haga tope. Empuje de forma lenta pero continuada; el indicador de la dosis desaparece.
- Fin de la inyección: el indicador de la dosis ha desaparecido por completo detrás de la ventana de visualización. Espere 5 segundos y retire la aguja.
- Después de retirar la aguja: limpie la zona donde ha realizado la inyección con la gasa empapada de alcohol, realizando un movimiento circular.
- Después de la inyección, vuelva a colocar cuidadosamente el capuchón externo de la aguja.

Más información:

- Se recomienda ir cambiando el punto de punción del fármaco.
- **Conservar** en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. **Conservar** en el embalaje original para protegerlo de la luz.
- Utilizar todos los días aproximadamente **a la misma hora**.

VIDEO DE ADMININISTRACIÓN:

<https://comousarbemfola.com/Bemfola-Instruccional.mp4>

(pulsar tecla Ctrl+click para seguir vínculo)