

DECAPEPTYL

diario 0,1 mg



DECAPEPTYL

diario 0,1 mg

1. PRESENTACIÓN DEL DECAPEPTYL DIARIO 0,1 mg.

- Contiene 7 viales de polvo cada uno y 7 ampollas de disolvente.
- Aspecto del polvo: liofilizado blanco.
- Aspecto del disolvente: solución límpida e incolora.

2. ANTES DE LA INYECCIÓN:

- Lavarse las manos.
- Preparar todo lo necesario:
 - Vial conteniendo el polvo de Decapptyl® diario
 - Ampolla de disolvente
 - Jeringa, aguja de preparación (calibre 20), aguja fina para la inyección subcutánea (calibre 27) y torunda impregnada en alcohol.



3. PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN

1. Preparación y reconstitución

- Retirar la tapa de plástico amarillo del vial que contiene el polvo.
- Golpear suavemente la parte superior de la ampolla de disolvente para desplazar el líquido a la parte inferior de ésta.
- Colocar la ampolla con el punto azul mirando hacia ti, cubrir la parte superior con una gasa para no cortarse y romperla.





- Colocar la aguja grande (intramuscular) en la jeringuilla e introducirla en la ampolla del disolvente.
- Recuperar todo el contenido de la ampolla e introducirlo lentamente en el vial del polvo, pinchando en el centro del tapón de goma y llegando al final del vial.
- Para facilitar la disolución del polvo, sin sacar la aguja ni soltar el émbolo, se realiza un movimiento suave con la mano.
- El siguiente paso será recuperar la dosis que haya pautado el ginecólogo y cambiar la aguja por la subcutánea.
Con la finalidad de eliminar el aire que pueda haber en la jeringa, hay que sujetar la jeringa con la aguja hacia arriba y golpearla suavemente hasta que el aire se acumule en la parte superior. Después, hay que presionar lentamente el émbolo hasta eliminar todo el aire.

2. Preparación del lugar de inyección

- La administración del Decapeptyl® diario es por vía subcutánea. El mejor lugar para inyectar el medicamento es el abdomen, justo por debajo del ombligo, pero también puede hacerse en la parte superior del muslo. También se recomienda cambiar cada día el punto de inyección de la dosis, para proteger la piel.
- Limpiar la zona de inyección frotándola con una torunda de alcohol y esperar hasta que se seque (tardará alrededor de 1 minuto).

3. Inyectar el medicamento

- Pellizque firmemente la piel. Con la otra mano, inserte la aguja en la piel en un ángulo de 45 ° ó 90 ° respecto a la superficie. Soltar la piel pellizcada.



- Presionamos el émbolo de la jeringa lentamente y de forma constante, de modo que la solución sea inyectada correctamente y la piel no se dañe.
- Espere 5 segundos antes de retirar la aguja de la piel.
- Retire la aguja y presione en el sitio de la inyección con un algodón impregnado en alcohol.



4. DESPUÉS DE LA INYECCIÓN

- Colocar la capucha de la aguja.
- Desechar inmediatamente la aguja utilizada de forma segura.



MÁS INFORMACIÓN

- Este fármaco debe mantenerse a temperatura ambiente, no superior a los 25°C.
- Después de la reconstitución de la solución se debe proceder inmediatamente a la administración y aproximadamente a la misma hora cada día.
- El efecto adverso notificado más frecuente es la irritación localizada en la zona de inyección del fármaco que son normalmente de naturaleza pasajera y de intensidad leve.

Otros efectos adversos son consecuencia de los cambios en los niveles hormonales, como sofocos, cefaleas, cambios de humor, disminución de la libido o alteraciones del sueño.

- Si la dosis utilizada es inferior a lo que contiene un vial, el sobrante sí que debe guardarse en la nevera. Se recomienda que 5 minutos antes de ser administrado, se saque de ésta para que se vaya atemperando. También tiene que estar protegido de la luz hasta que vaya a utilizarse.