

MENOPUR

600 UI y 1200 UI



MENOPUR


600 UI y 1200 UI

1. PRESENTACIÓN DEL MENOPUR® 1200 UI

- Cada vial de polvo contiene menotropina equivalente a 1200 UI de actividad FSH y 1200 UI de actividad LH.
- Cada ml de solución reconstituida contiene 600 UI de FSH y LH.

El envase incluye:

- 1 vial de Menopur de 1200UI
- 2 jeringas precargadas de disolvente para reconstitución.
- 1 aguja para reconstituir.
- 18 toallitas con alcohol.
- 18 jeringas desechables con aguja prefijada para la administración.



2. ANTES DE LA INYECCIÓN

- Lavarse las manos.
- Si teníamos el envase en la nevera retirarlo unos minutos antes.

3. PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN:


1. Preparación y reconstitución:

- Retirar la tapa protectora del vial.
- Coger la aguja y desenroscar el manguito protector.
- Quitar la tapa de goma de la jeringa precargada y conectar la aguja retirando la capucha protectora.
- Insertar cuidadosamente la aguja a través del centro del tapón de goma del vial e inyectar lentamente todo el líquido para evitar la formación de burbujas.
- Coger la segunda jeringa precargada y repetir los pasos previos utilizando la misma aguja de reconstitución.
- Inyectamos de nuevo todo el líquido en el vial.
- Extraer la aguja.

Para ayudar a la disolución mover suavemente el vial. Evite agitarlo para que no se formen burbujas de aire.

2. Preparación del lugar de la inyección

- El mejor lugar para inyectar el medicamento es el abdomen, justo por debajo del ombligo, pero también puede hacerse en la parte superior del muslo. Trate de variar ligeramente el sitio exacto de la inyección cada vez que se inyecte.
- Limpiar la zona de inyección frotándola con una torunda de alcohol y esperar hasta que se seque (tardará alrededor de 1 minuto).



3. Regulación de la dosis prescrita:

- Coja una jeringa desechable y retire la cubierta protectora.
- Inserte la aguja a través del tapón de goma del vial.
- Ponga el vial boca abajo y extraiga la cantidad necesaria tomando como referencia la graduación de la jeringa
- Golpee suavemente la jeringa hasta que el aire se quede en la parte superior. A continuación, empuje el émbolo hasta que salga todo el aire y aparezca una gota en la punta de la aguja.



4. Inyección

- Limpie la zona de inyección con la toallita de alcohol.
- Pellizque la piel para producir el pliegue.
- Inserte la aguja con un movimiento rápido a 45 o 90° del cuerpo.
- Empuje suavemente el émbolo hasta el final.
- Espere 5 segundos antes de retirar la aguja.
- Retire la aguja y limpie con un poco de alcohol.



¡En el caso del Menopur® 600UI: Solo diluiremos el vial de polvo con UNA JERINGA DE DISOLVENTE PRECARGADA.

¡El resto de pasos serán exactamente iguales a los del Menopur® 1200UI.

MÁS INFORMACIÓN

- El vial contiene medicación para varios días de tratamiento dependiendo de la dosis que le haya prescrito el médico.
- Solo deberá extraerse e inyectarse la cantidad que le haya prescrito su médico para cada día.
- No se recomienda utilizar jeringas que no acompañan al Menopur ya que vienen graduadas en UI a diferencias de las usuales que vienen en mm.
- Se deberá administrar todos los días a la misma hora.
- IMPORTANTE: antes de la reconstitución el MENOPUR 1200UI debe conservarse en nevera (entre 2°C y 8°C) antes de su uso. Conservarlo en su envase original para protegerlo de la luz.
- Después de la reconstitución puede guardarse durante un máximo de 28 días a no más de 25°C.