

MENOPUR 75 UI

5 ampollas+5 viales de disolvente

10 ampollas+10 viales de disolvente




MENOPUR 75 UI

5 ampollas+5 viales de disolvente
10 ampollas+10 viales de disolvente

1. PRESENTACIÓN DEL MENOPUR® 75 UI

- Polvo y disolvente para solución inyectable.
- Apariencia del polvo: polvo liofilizado apelmazado blanco a grisáceo.
- Apariencia del disolvente: solución transparente incolora.



2. ANTES DE LA INYECCIÓN

- Lavarse las manos.
- Preparar todo lo necesario:
 - Jeringa de 2ml
 - Aguja intramuscular para reconstituir (calibre 20)
 - Aguja subcutánea para la inyección (calibre 27)
 - Un algodón con alcohol.
- **El kit de administración se entregará en la unidad de Reproducción Asistida)**

3. PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN:



1. Preparación y reconstitución:

- Retirar el sello de plástico del vial que contiene el Menopur.
- De unos ligeros golpecitos a la ampolla que contiene el disolvente para asegurarnos el contenido queda en la parte inferior. Rompa la parte superior de la ampolla con el punto mirando hacia usted.
- Coloque la base de la aguja intramuscular en la punta de la jeringuilla.
- Retirar la cubierta de la aguja.
- Insertar la aguja en la ampolla de disolvente extrayendo todo el contenido
- Insertar la aguja con la jeringa a través del tapón de goma del vial de polvo.
- El polvo se disolverá rápidamente (en 2 minutos), formando una solución transparente.
- Para ayudar a la disolución del polvo, remuévala suavemente entre las manos. NO AGITAR, ya que puede causar burbujas de aire.
- **Cuando se reconstituye más de 1 vial de Menopur 75® hasta llegar a la dosis prescrita, extraer el contenido reconstituido del primer vial dentro de la jeringa, e inyectarlo lentamente en un segundo vial. Repetir hasta que los contenidos del número de viales requeridos equivalentes a la dosis prescrita se disuelvan (3 viales con polvo como máximo de Menopur® 75 UI en una ampolla de disolvente).**



2.- Inyección

- Cambiar la aguja gruesa por una aguja corta y delgada (subcutánea).
- Golpear suavemente la jeringa hasta que el aire se quede en la parte superior.
A continuación, empujar el émbolo hasta que salga todo el aire y aparezca una gota en la punta de la aguja.
- Limpiar la zona de inyección con alcohol.
- Coger un pliegue cutáneo del abdomen e introducir la aguja por completo y orientada 90°.
- Empujar suavemente el émbolo hasta el final.
- Esperar 5 segundos antes de retirarla.
- Retirar la aguja y limpiar la zona con una toallita con alcohol.



4. DESPUÉS DE LA INYECCIÓN

- Colocar la capucha de la aguja.
- Desechar inmediatamente la aguja utilizada de forma segura.

MÁS INFORMACIÓN

- No conservar a temperatura superior a 25 °C. No congelar. Conservar en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.
- No usar si la solución contiene partículas o si no está límpida.
- La medicación no incluye las jeringas y agujas. Las debe adquirir aparte. Pregunte en su centro.
- Utilizar inmediatamente después de su preparación y aproximadamente y a la misma hora cada día.
- Se puede disolver hasta un máximo de tres viales con polvo en una ampolla de disolvente.