

## OVITRELLE

250 mcg/0.5ml



# OVITRELLE


250 mcg/0.5ml

Presentación de Ovitrelle® 250mcg/0.5ml:

- Envase con una pluma precargada de 250,mcg/ 0.5ml.
- Aguja de inyección

## 1.- ANTES DE LA INYECCIÓN:

- Lávese las manos. Es importante que sus manos y los materiales que utilice estén lo más limpios posible.
- Reúna todo lo que vaya a necesitar:
  - Dos torundas de algodón empapadas en alcohol
  - la jeringa precargada que contiene el medicamento.
- Aguja de inyección.  
(Tenga en cuenta que las torundas empapadas en alcohol no se incluyen en el embalaje).



## 2.- PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN



### 1. Preparación de la pluma precargada:

- Quitar el capuchón de la pluma.
- Coger la aguja que se entrega con la caja.
- Comprobar que la pestaña despegable de la funda externa de la aguja no este dañada o suelta.
- Arranque la pestaña.
- Apretar el extremo con rosca de la pluma contra la funda externa de la aguja y enrósquela hasta que esté bien sujeta.
- Retirar la funda externa de la aguja tirando de ella (no tire la funda porque le ayudará a retirar la aguja después).
- Observar si hay una burbuja de aire en el interior de la pluma de gran tamaño. En caso afirmativo:
  - Girar con cuidado el botón de ajuste de dosis en el sentido de las agujas del reloj hasta que vea un punto ( ● ) en el indicador de la dosis.
  - Quitar el protector de la aguja y sostenga la pluma en vertical hacia arriba.
  - Golpear suavemente con el dedo el soporte del depósito para que las burbujas se eleven hacia la aguja.
  - Pulsar lentamente el botón. Debe aparecer una gota en la punta de la aguja. Indicará que la pluma esta lista.
- Girara suavemente el botón de ajuste de dosis hasta que en la ventana que indica la dosis aparezca el número “250”.



## 2. Inyección:

- Elija el lugar de administración de la inyección siendo los puntos recomendables: la parte inferior del abdomen y el muslo.
- Limpiar con una torunda con alcohol la zona.
- Comprobar de nuevo que la dosis está en “250”.
- Pellizcar firmemente la piel. Con la otra mano, inserte la aguja en la piel en un ángulo de 45 ° ó 90 ° respecto a la superficie. Soltar la piel pellizcada.
- Apretar el botón completamente. El número de la dosis volverá a “0”.
- Debe mantener la aguja bajo la piel con el botón de ajuste de dosis apretado al menos durante 10 segundos.
- Sacar la pluma con el botón apretado.



## 3.- DESPUÉS DE LA INYECCIÓN

- Colocar la capucha de la aguja.
- Desenroscar la aguja y desecharla de forma segura.

### MÁS INFORMACIÓN

- Cada jeringa precargada es para un solo uso. No usar si la solución contiene partículas o si no está límpida
- Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). Conservar en el embalaje original.
- Ovitrelle 250 microgramos solución inyectable puede conservarse a temperatura ambiente (no superior a 25°C) durante un máximo de 30 días, sin refrigerarlo de nuevo durante este periodo, y debe desecharse si no se utiliza durante estos 30 días.
- Su médico le indicará la hora exacta a la que debe administrarse el Ovitrelle. Si por lo contrario la pauta se retrasase o adelantase, notifíquelo con el centro de Reproducción Asistida para que lo tengan en cuenta.